



fidia

Estimado/a Dr./Dra.:

Para el tratamiento de **procesos infecciosos e inflamatorios oculares**, Fidia Pharma comercializa **Oftalmolosa Cusí de Icol®**, pomada en cuya composición se encuentra el cloranfenicol, que es el antibiótico de primera línea recomendado.¹

Para la conjuntivitis bacteriana que no se resuelve en tres días, se recomienda fuertemente cloranfenicol tópico². **Oftalmolosa Cusí de Icol®** está especialmente recomendado en tratamiento nocturno³ y en niños.⁴



Clasificación terapéutica:

- CONJUNTIVITIS AGUDA
- CONJUNTIVITIS ALÉRGICA
- CONJUNTIVITIS CRÓNICA
- QUERATITIS

Con riesgo bajo para la lactancia^{5,6}

Consulte la **Ficha Técnica AQUÍ**

Quiero más información



www.fidiapharma.es

Referencias bibliográficas: 1. National Institute for Health and Care Excellence, 2021. Summary of antimicrobial prescribing guidance—managing common infections [online]. Disponible en: <https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/antimicrobial-prescribing-guidelines> [Último acceso mayo 2022]. 2. Chan VF et al. A Systematic Review of Clinical Practice Guidelines for Infectious and Non-infectious Conjunctivitis. Ophthalmic Epidemiology (2021)- <https://doi.org/10.1080/09286586.2021.1971262>. 3. Mendiola F; Antibióticos tópicos en Oftalmología: Aspectos prácticos. Paediatrica 2001; 2 (4): 22-24. 4. Cave JA. Chloramphenicol eye drops, boron, infants and fertility. Drug Ther Bull. 2021 Jul;59(7):98. 5. Nahum GG, Uhl K, Kennedy DL. Antibiotic use in pregnancy and lactation: what is and is not known about teratogenic and toxic risks. Obstet Gynecol. 2006. 6. Chin KG, McPherson CE 3rd, Hoffman M, Kuchta A, Mactal-Haaf C. Use of anti-infective agents during lactation: Part 2--Aminoglycosides, macrolides, quinolones, sulfonamides, trimethoprim, tetracyclines, chloramphenicol, clindamycin, and metronidazole. J Hum Lact. 2001 Feb;17(1):54-65.